

Klinička bolnica "Sveti Duh"

Povjerenstvo za kontrolu bolničkih infekcija

Brankica Grgurić, bacc. med. techn.

**POSTUPNIK DNEVNOG NADZORA MJESTA
INSERCIJE CVK-A**

POSTUPNIK VAĐENJA CVK-A

DIO PROCESA	AKTIVNOST	STANDARD	ODGOVORNA OSOBA
OSIGURATI UVJETE RADA	<p>MATERIJAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolica i tacna s potrebnim materijalom - sterilni set (kompresse) ili (kompresse + pean) - polialkoholni dezinficijens za kožu Skin des - Octenisept - sterilne rukavice - prozirna folija ("Tegaderm" flaster) - bubrežasta zdjelica sterilna /jednokratna 	<ul style="list-style-type: none"> - sterilni set (kompresse, pean) - polialkoholni dezinficijens Skin des - Octenisept - Mediflex rukavice - sterilne rukavice 	glavna sestra, tehničar JIL-a odjela, medicinska sestra medicinski tehničar
	<ul style="list-style-type: none"> - odrediti vrijeme i medicinsku sestru (9-11 sati) - dezinfekcija ruku prije postupka / 30 sek 	<ul style="list-style-type: none"> - nadzor (9-11 sati) - dezinfekcija ruku /manorapid / 30 sek I na suhe ruke navući rukavice 	medicinska sestra, medicinski tehničar
SVAKODNEVNI NADZOR MJESTA INSERCIJE CVK-a	<ul style="list-style-type: none"> - POSTUPAK S PROZIRNIM BEZIGLENIM PRIPOJEM /PRODUŽENOM LINIJOM 	<ul style="list-style-type: none"> - prije svake uporabe beziglenog pripoja, što uključuje ulazak u pripoj štrcaljkom ili infuzijskim setom, te vakumskim sustavom za uzimanje krvi, potrebno je dezinficirati pripoj dezinfekcijskim sredstvom Skin des ili jednokratnom maramicom i dezinficijensom, što uključuje mehaničko brisanje pripoja kroz 15 – 30 sekundi. Nakon nanošenja sredstva potrebno je pričekati da se sredstvo posuši (15 – 30 sekundi) - Isprati kateter kroz pripoj prije davanja lijeka ili nastavljanja infuzijske otopine 	
	<ul style="list-style-type: none"> - skinite ovoj i utvrdite status ili promjene na koži (mediflex rukavice) odbacite, po postupku dezinficirajte ruke (crvenilo, otok, gnoj, oštećenje kože, vlaženje, bol) dezinficirati mjesto insercije ,oduzeti aspirat ili bris kože za mikroiološku.obradu 	<ul style="list-style-type: none"> - crvenilo, otok, bol, gnoj na mjestu insercije – upisati u nadzornu listu - OBVEZNO OBAVIJESTITI LIJEČNIKA - aseptični postupak oduzimanja uzorka 	medicinska sestra, medicinski tehničar

UTVRĐIVANJE
STATUSA
MJESTA
INSERCIJE
CVK-A

<p>A) NEMA ZNAKOVA INFEKCIJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanje kože b.o. 	<ul style="list-style-type: none"> - kožu dezinficirajte od mjesta insercije prema van koristeći -- sterilni pean - na suhu kožu stavite sterilan Tegaderm koji može ostati 5-7 dana - sterilna kompresna + micropore - dezinficiraju ruke po završenom postupku - ISPUNITE NADZORNU LISTU 	<p>medicinska sestra, medicinski tehničar</p>
<p>B) ZNACI INFEKCIJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzeti uzorak na mikrobiološku obradu s mjesta insercije (aspirat , bris) - izvaditi CVK oduzeti hemokulture iz cvk-a te iz periferije obilježiti bočicu od hemokulture krv iz periferije ili cvk-a - zadati preko kompjutera mikrobiološku obradu 	<ul style="list-style-type: none"> - dezinficirajte kožu oko cvk-a sa sterilnim kompresama I Skin Desom ,ostavite da se koža osuši , te sterilnim rukavicama izvadite cvk-a , vrh odrezati sterilnim škarama u sterilnu posudu (kožu i okolinu zaštitite sterilnom kompresom da ne kontaminirate vrh cvk-a) - Aseptičnim postup kao izvadite krv za hemokulturu cvk-a + periferija - 	<p>liječnik, medicinska sestra</p> <p>provođenje postupka sukladno Postupniku koristite holder za vađenje hemokulture bočica + holder</p>
<p>C) CVK više nije potreban</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zdravstveno stanje bolesnika više ne zahtijeva tretman preko CVK- postupak vađenja 	<p>liječnik</p>

DIO PROCESA	AKTIVNOST	STANDARD	ODGOVORNA OSOBA
POSTUPAK VAĐENJA CVK	<ul style="list-style-type: none"> - dezinfekcija ruku djelatnika - mjesto insercije dezinficirati sa Skin desom - mjesto insercije prekriti sterilnom kompresom - obavezno vrh cvk-a poslati na bakteriološku obradu 	<p>Aseptičan rad Higijenska dezinfekcija ruku 20 – 30 sek Sterilne rukavice Sterilne komprese 5x5 , sterilna kompresa 50x50 Skin des za dezinfekciju kože oko mjesta insercije Sterilne škare Sterilni pvc kontejner</p> <p>ISPUNITI NADZORNU LISTU</p>	<p>liječnik, medicinska sestra medicinski tehničar</p> <p>Medicinska sestra /medicinski tehničar</p>
TRANSPORT UZORKA ZA MIKROBIOLOŠKU OBRADU	Uzorak transportirajte u suhom sterilnom kontejneru	<p>Uzorak odmah transportirajte u laboratorij a najkasnije unutar dva sata</p> <p>NE ZABORAVITE UPISATI NALAZ U SESTRINSKU NADZORNU LISTU</p>	medicinska sestra medicinski tehničar